

Catálogo de produtos





Inovação e compromisso com a pecuária.

*Indústria farmacêutica veterinária 100% brasileira, a **JA Saúde Animal** é especializada na pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras em saúde animal, além de possuir ampla estrutura fabril e comercial.*

Com a missão de oferecer ao mercado medicamentos eficazes, seguros e inovadores, a empresa conta com equipe interna qualificada, bem como amplo time comercial atuante em todo Brasil. Além da sólida atuação nacional, sob o lema "Innovation crossing borders", a JA possui departamento exclusivo de Comércio Exterior (COMEX), exportando produtos para diversos países da América Latina, África e em expansão para outras regiões.

*A **JA Saúde Animal** foi destaque como uma das empresas que mais cresceram nas américas, segundo matéria publicada em 2020 pelo consagrado jornal inglês **Financial Times**.*



Antimicrobianos

LANÇAMENTO



☑ PENICILINA PPU E DE LONGA AÇÃO

Vetipen® L.A é uma associação de amplo espectro e alta eficácia à base de Penicilinas e Di-hidroestreptomicina. Por ser pronto para uso (PPU) e possuir longa ação, **Vetipen® L.A** proporciona praticidade no manejo, além de não necessitar de refrigeração.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular, na dose de 1 mL para cada 10 kg. Se necessário repetir a dose após 72h, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Penicilina G Procaína	10.000.000 UI
Penicilina G Benzatina	10.000.000 UI
Di-hidroestreptomicina	20 g
Veículo q.s.p	100 mL

Apresentação: 50 mL.

LANÇAMENTO



☑ ANTIBIÓTICO DE EXTRA LONGA AÇÃO

Benzafort® 12 Milhões é inovador por ser o único antibiótico naturalmente de extra longa ação do mercado. Em apresentação pronta para uso (PPU) e dose única, **Benzafort® 12 Milhões** promove proteção antimicrobiana duradoura, reduzindo o número de aplicações e facilitando o manejo na propriedade.

Modo de uso e dosagem: aplicação via intramuscular, em dose única de 1 mL para cada 10 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Benzilpenicilina Benzatina	12.000.000 UI
Veículo q.s.p.	50 mL

Apresentação: 50 mL.

LANÇAMENTO



☑ EFICÁCIA MAIS ECONOMIA NOTA 10!

Enro®10 é uma formulação à base de Enrofloxacin 10%, a mais potente molécula da classe das Quinolonas do mercado veterinário. Com ação bactericida de amplo-espectro, Enro 10 pode ser utilizado no tratamento de uma infinidade de doenças em animais.

Modo de uso e dosagem: Aplicação intravenosa ou intramuscular, na dosagem de 1 mL/40 kg, diariamente, durante 3 a 5 dias. Nas infecções graves e Anaplasmose, usar a dose de 1 mL/20 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Enrofloxacin.....	10 g
Veículo q.s.p.....	100 mL

Apresentação: 100 e 500 mL.

LANÇAMENTO



✓ ALTA EFICÁCIA NAS ENFERMIDADES RESPIRATÓRIAS E DIGESTIVAS

Vetflor® é um antimicrobiano de amplo espectro, que atua sobre bactérias Gram-negativas, Gram-positivas, rikétsias, espiroquetas e micoplasma.

Modo de uso e dosagem: aplicação via intramuscular, na dose de 1 mL para cada 15 kg de peso vivo, em intervalos de 48h, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:
 Florfenicol 30 g
 Veículo q.s.p 100 mL

Apresentação: 30 e 100 mL.



ORIGINAL INJETÁVEL

✓ PROTEÇÃO MÁXIMA PARA O RECÉM-NASCIDO

Pró-bezerro é uma associação de antimicrobiano de longa ação com antiparasitário, indicada no controle das doenças do umbigo (onfalite e miíase) e suas consequências durante todo o 1º mês de vida do bezerro.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular (profunda) na face interna da coxa, em dose única de 1 mL para cada 8 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:
 Benzilpenicilina Benzatina 24.000.000 UI
 Ivermectina 200 mg
 Veículo q.s.p 100 mL

Apresentação: seringa de 5 mL e frasco de 50 mL.

✓ A PENICILINA 10 MILHÕES DE RÁPIDA AÇÃO E ALTA EFICÁCIA

Diclopen® 10 milhões é uma associação de Penicilinas de rápida ação, com Estreptomicina e Diclofenaco de Sódio, indicado para o tratamento de doenças como mastites, doenças respiratórias, metrites, tétano, leptospirose, doenças supurativas, entre outras.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular, na dosagem de 1 mL para cada 12,5 kg, a cada 24 horas, por 3 dias, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada frasco-ampola de pó contém:
 Benzilpenicilina Procaína 7.500.000 UI
 Benzilpenicilina Potássica 2.500.000 UI
 Sulfato de Estreptomicina 5.000 mg
 Cada frasco-ampola de diluente contém:
 Diclofenaco de Sódio 375 mg
 Veículo q.s.p 30 mL

Apresentação: 10 milhões de UI.



Antimicrobianos



 Aplicação
Intravenosa ou
Intramuscular

LANÇAMENTO



✔ ASSOCIAÇÃO SINÉRGICA DE AÇÃO IMEDIATA E ALTA EFICÁCIA

Gentopen® 20 Milhões é a única Penicilina intravenosa do mercado, indicado no tratamento de infecções agudas e super agudas em bovinos e equinos, como a mastite ambiental, infecções respiratórias, abdome agudo e septicemias em geral.

Modo de uso e dosagem: aplicação intravenosa ou intramuscular, 1 frasco* de 12 em 12 horas, com tratamento mínimo de 3 dias, a critério do Médico Veterinário.

*Dose para um animal de 500 kg.

Fórmula:

Cada frasco-ampola de pó contém:
Benzilpenicilina Potássica 20.000.000 UI
Cada frasco-ampola de diluente contém:
Sulfato de Gentamicina 1,66 g
Veículo q.s.p. 30 mL

✔ TRATAMENTO DE INFECÇÕES AGUDAS E SUPER AGUDAS EM POTROS E BEZERROS

Gentopen® 10 Milhões é indicado no tratamento de infecções agudas e super agudas em potros e bezerros.

Modo de uso e dosagem: aplicação intravenosa ou intramuscular, 1 frasco* de 12 em 12 horas, com tratamento mínimo de 3 dias, a critério do Médico Veterinário.

*Dose para bovinos e equinos de pequeno porte (peso aproximadamente 250 kg)

Fórmula:

Cada frasco-ampola de pó contém:
Benzilpenicilina Potássica 10.000.000 UI
Cada frasco-ampola de diluente contém:
Sulfato de Gentamicina 0,830 g
Veículo q.s.p. 15 mL

✔ A PENICILINA 5 MILHÕES DE RÁPIDA AÇÃO E ALTA EFICÁCIA

Diclopen® 5 milhões é uma associação de Penicilinas de rápida ação, com Estreptomicina e Diclofenaco de Sódio, indicado para o tratamento de doenças como mastites, doenças respiratórias, metrites, tétano, leptospirose, doenças supurativas, entre outras.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular, na dosagem de 1 mL para cada 12,5 kg, a cada 24 horas, por 3 dias, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada frasco-ampola de pó contém:
Benzilpenicilina Procaína 3.750.000 UI
Benzilpenicilina Potássica 1.250.000 UI
Sulfato de Estreptomicina 2.500 mg
Cada frasco-ampola de diluente contém:
Diclofenaco de Sódio 187,5 mg
Veículo q.s.p. 15 mL

Apresentação: 5 milhões de UI.



☑ **ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO COM AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA, ANALGÉSICA E ANTITÉRMICA**

Diclotril® é um antimicrobiano bactericida de amplo espectro, associado a anti-inflamatório, que combate enfermidades como mastites, metrites, anaplasmose, infecções respiratórias e infecções pós-parto.

Modo de uso e dosagem: aplicação intravenosa ou intramuscular, na dose de 1 mL para cada 40 kg. Nos casos de infecções graves e anaplasmose recomenda-se a dose de 1 mL para cada 20 kg, a cada 24 horas, por pelo menos 3 dias, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Cloridrato de Enrofloxacinina	10 g
Diclofenaco de Sódio	375 mg
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 50, 100 e 250 mL.



☑ **ÚNICA ASSOCIAÇÃO DE SULFAMETOXAZOL E TRIMETOPRIM COM ANTI-INFLAMATÓRIO**

Vetsulfa é uma associação de dois antimicrobianos sinérgicos com anti-inflamatório para o tratamento de infecções graves como mastites, diarreias, infecções respiratórias, metrites, doenças supurativas, entre outras.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular, intravenosa ou subcutânea, na dosagem de 2 mL para cada 15 kg, a cada 24 horas, por pelo menos 3 dias, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Sulfametoxazol	20 g
Trimetoprim	4 g
Diclofenaco de Sódio	375 mg
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 50 e 100 mL.



☑ **O ANTIBIÓTICO MULTIUSO**

Tetra-micina possui amplo-espectro de ação e dose única, garantindo ação prolongada contra as bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, dentre outros microrganismos. Além disso, é um antibiótico multiuso, já que pode ser utilizado em uma infinidade de quadros infecciosos comuns em grandes animais.

Modo de uso e dosagem: administração via intramuscular na dose de 1 mL para cada 10 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Oxitetraciclina Di-hidrato	21,6 g*
Veículo q.s.p.	100 mL

* Equivalente a 20 g de Oxitetraciclina Base.

Apresentação: 50 e 100 mL.

Antimicrobianos



✓ LONGA AÇÃO E ALTA SERINGABILIDADE

Amox L.A é um antimicrobiano à base de Amoxicilina, uma Penicilina sintética de longa ação e de potente ação bactericida, eliminando bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Sua formulação exclusiva permite excelente diluição e seringabilidade, o que facilita a aplicação e o manejo na propriedade.

Modo de uso e dosagem: Aplicação intramuscular na dose de 1 mL para cada 10 kg. Se necessário pode-se repetir a dose após 48 horas, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Amoxicilina (tri-hidratada) 15 g
Veículo q.s.p 100 mL

Apresentação: 100 mL.

Vaca em Lactação - Terapia Intramamária



60
HORAS
CARÊNCIA
NO LEITE

✓ O ANTIMASTÍTICO COMPLETO

Mastite Clínica VL® é uma associação exclusiva à base de Amoxicilina, Clavulanato de Potássio e Prednisolona, altamente eficaz na eliminação dos agentes etiológicos das mastites clínicas, associado a maior conforto do animal doente.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramamária, de 12 em 12 horas, com tratamento mínimo de 3 dias, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada seringa do produto contém:

Amoxicilina Tri-hidratada 200 mg
Clavulanato de Potássio 50 mg
Acetato de Prednisolona 10 mg
Veículo oleoso de liberação rápida q.s.p. 8 g

Apresentação: seringa com 8 g em display com 24 unidades.

✓ POTENTE AÇÃO BACTERICIDA À BASE DE CEFALOSPORINA

Mastclin® possui potente ação bactericida à base de Cefalosporina, indicado para a eliminação dos agentes causadores de mastites clínicas e com baixo período de carência no leite.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramamária, de 12 em 12 horas, com tratamento mínimo de 3 dias, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada seringa do produto contém:

Cefoperazone Sódico 250 mg
Veículo q.s.p. 10 mL

Apresentação: seringa com 10 mL em display com 24 unidades.



48
HORAS
CARÊNCIA
NO LEITE

Vaca em Lactação - Terapia Intramamária

LANÇAMENTO



3
DIAS
CARÊNCIA
NO LEITE

✓ MÁXIMO RESULTADO CONTRA AS MASTITES

Vetimax® é um antimicrobiano intramamário à base de Cloxacilina e Ampicilina. Sua formulação garante amplo espectro de ação, alta difusão na glândula mamária e baixo período de carência, sendo uma excelente solução para o controle das mastites em bovinos.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramamária de uma seringa por teto a cada ordenha, massageando após a aplicação. Realizar no mínimo 3 aplicações por teto, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada seringa do produto contém:

Cloxacilina (Sódica)	250 mg
Ampicilina (Sódica)	75 mg
Veículo q.s.p.	10 mL

Apresentação: seringa com 8 g em display com 20 unidades.

Vaca Seca - Terapia Intramamária



Nova
Embalagem
econômica
100 UNDS.

30
DIAS
CARÊNCIA
NO LEITE
APÓS
SECAGEM

✓ EFICÁCIA NA TERAPIA DE SECAGEM

Intrasec VS® é um intramamário para vaca seca indicado para prevenção e tratamento das mastites no período de secagem, auxiliando também na resolução das mastites não curadas durante a lactação.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramamária, dose única por teto, no momento da secagem, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada seringa do produto contém:

Cloxacilina Benzatina	600 mg
Veículo oleoso de liberação prolongada q.s.p.	8 g

Apresentação: seringa com 8 g em display com 24 unidades e balde com 100 unidades.



Nova
Embalagem
econômica
100 UNDS.

✓ SELANTE INTRAMAMÁRIO PARA MAIOR PROTEÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SECAGEM

SELATETO® é um selante intramamário responsável por formar uma barreira mecânica no esfíncter do teto, protegendo contra a entrada de microrganismos durante o período de secagem.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramamária, dose única por teto, no momento da secagem, a critério do Médico Veterinário. Não massagear o teto após aplicação.

Fórmula:

Cada seringa do produto contém:

Subnitrato de Bismuto	2,60 g
Veículo q.s.p.	4,00 g

Apresentação: seringa com 4 g em display com 24 unidades e balde com 100 unidades.

Babesicida



✓ CERTEIRO CONTRA A TRISTEZA PARASITÁRIA (TPB)

Ganavet® Plus é um babesicida com dupla ação, combate a tristeza parasitária e a febre simultaneamente.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular (profunda), na dose de 1 mL para cada 20 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

A cada 100 mL do produto contém:

Diminazeno	7 g
Fenazona	37 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 30 e 50 mL.

Antiparasitários

SEM ESTRESSE
NO REBANHO



28
DIAS
CARÊNCIA
PARA ABATE

✓ VERMIFUGAÇÃO PRÁTICA E EFICAZ

Em exclusiva formulação de rápida absorção, **Frigoboi® Facilite** é um endectocida de fácil aplicação e baixo período de carência para o abate. Além de combater os parasitas externos, possui excelente ação contra as verminoses, importante causa de prejuízos na criação de bovinos.

Modo de uso e dosagem: aplicação *pour-on*, na dose de 10 mL para cada 100 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Abamectina	0,5 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 1000 e 5000 mL.

✓ VERMÍFUGO DE AMPLO ESPECTRO COM BAIXO PERÍODO DE CARÊNCIA

Frigoboi® Produção é um endectocida injetável à base de Abamectina, que combate os parasitas externos e possui excelente ação contra as verminoses, que são altamente impactantes na lucratividade da criação de bovinos.

Modo de uso e dosagem: aplicação subcutânea (tábua do pescoço), na dose de 1 mL para cada 50 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Abamectina	1 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 500 e 1000 mL



35
DIAS
CARÊNCIA
PARA ABATE

LANÇAMENTO



Carência
no leite
24
horas

Carência
na carne
6
dias

✓ MÁXIMA EFICÁCIA ECTOPARASITICIDA!

Insemax é um ectoparasiticida composto à base de Cipermetrina, Clorpirifós e Butóxido de Piperonila, que age no combate de carrapatos, moscas e bernes. Essa associação de Organofosforado, Piretróide de última geração e Piretrina, alia máxima ação contra os ectoparasitas, com baixo período de carência para leite e corte, permitindo utilização com segurança em bovinos.

Modo de uso e dosagem: aplicação *pour-on*, na dose de 10 mL para cada 100 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 g do produto contém:

Cipermetrina.....	5,0 g
Clorpirifós.....	7,0 g
Butóxido de Piperonila	1,0 mL
Veículo q.s.p.	100,0 mL

Apresentação: 1000 e 5000 mL.

✓ VERMÍFUGO CONCENTRADO DE LONGA AÇÃO



122
DIAS
CARÊNCIA
PARA ABATE

Longamectina® Premium 3,5% é um endectocida concentrado de longa ação, que combate as verminoses e os parasitas externos como carrapatos e bernes. Apresenta formulação ajustada a 100% de B1A, fração da Ivermectina eficaz contra os parasitas.

Modo de uso e dosagem: aplicação subcutânea (tábua do pescoço), na dose de 1 mL para cada 50 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Ivermectina	3,50 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

Apresentação: 50, 500 e 1000 mL.

✓ AMPLO ESPECTRO NO COMBATE AOS PARASITAS

Ivermectina® 1% J.A é um endectocida de amplo espectro, que age contra verminoses e parasitas externos, além de oferecer alta segurança para todas as categorias animais.

Modo de uso e dosagem: aplicação subcutânea (tábua do pescoço), na dose de 1 mL para cada 50 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Ivermectina	1 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 50, 500 e 1000 mL.



35
DIAS
CARÊNCIA
PARA ABATE

Antiparasitários



✓ VERMÍFUGO COMPOSTO DE AMPLO ESPECTRO

Equijet® é um antiparasitário oral em pasta, à base de Ivermectina e Pamoato de Pirantel, que apresenta amplo espectro de ação no tratamento e controle das parasitoses internas dos equinos. Por ser hidrossolúvel, age em todo o percurso intestinal, eliminando até mesmo os vermes na porção final do intestino.

Modo de uso e dosagem: aplicação via oral, no fundo da boca, sobre a língua do animal, que deve estar sem alimento, na dose de 5 g para cada 100 kg de peso vivo (1 seringa para um animal adulto), a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 g do produto contém:

Ivermectina	0,4 g
Pamoato de Pirantel	38,3 g
Veículo q.s.p.	100 g

Apresentação: seringa dosadora contendo 25 g.

✓ O FIM DA BICHEIRA

Tanicura® é um ectoparasiticida indicado no tratamento e controle de bicheiras (miíases), além de proteger escoriações, feridas de castração, de descorna, de decúbito, cirúrgicas e o umbigo de recém-nascidos. Tanicura também auxilia no controle de carrapatos, pulgas e piolhos.

Modo de uso e dosagem: polvilhar sobre a ferida para prevenir e combater a infestação de bicheiras (miíases) e outros ectoparasitas. Para controlar as reinfestações, repetir a cada 07 dias, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 g do produto contém:

Carbaril	2 g
Cipermetrina	1 g
Violeta de Genciana	0,1 g
Veículo q.s.p.	100 g

Apresentação: 200 e 1000 g.



Fortificantes



ZERO
CARENCIA

✓ FERRO DEXTRANO CONCENTRADO

Dextran 20% é um produto à base de Ferro Dextrano concentrado, o princípio ativo de eleição para prevenção e tratamento da Anemia Ferropriva em leitões. Sua alta concentração permite maior economia e aplicação de menor volume, contribuindo para o bem-estar animal.

Modo de uso e dosagem: aplicação via intramuscular, na região da coxa ou pescoço, em dose única de 1 mL, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Ferro Dextrano	20 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 50 mL.

LANÇAMENTO



ZERO
CARÊNCIA

☑ ATIVE MAIS PRODUTIVIDADE!

Ative A.D.E é um complexo vitamínico altamente concentrado à base de vitaminas A, D e E. Essa formulação exclusiva favorece maior conversão alimentar, fertilidade, aumento da imunidade, produtividade e diminuição do estresse do rebanho. Também acelera a recuperação de animais convalescentes, além de melhorar a aparência do rebanho.

Modo de uso e dosagem:

Administrar por via intramuscular profunda nas seguintes dosagens:
Bovinos e Equinos: 5 mL por animal a cada 30 ou 60 dias.
Suínos, ovinos e caprinos: 2 mL por animal a cada 60 dias.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Vitamina A Palmitato.....	27.000.000 UI
Vitamina D3.....	6.000.000 UI
Vitamina E Oleosa	5.500 UI
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 50 E 250 mL.

☑ REPOSITOR MINERAL, VITAMÍNICO, ENERGÉTICO E PROTETOR HEPÁTICO

TurboCálcio é um suplemento injetável completo à base de minerais, Sorbitol, Vitamina B1 e protetor hepático. Pode ser utilizado como terapia suporte à animais debilitados, fortificante em animais atletas ou de lida e no tratamento de doenças puerperais em fêmeas bovinas.

Modo de uso e dosagem: aplicação intravenosa lenta, na dose de 1 mL por kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Gluconato de Cálcio	20 g
Glicerofosfato de Cálcio	2 g
Cloreto de Magnésio	6 g
Cloridrato de Tiamina (Vitamina B1)	0,06 g
Sorbitol	4,2 g
DL Metionina	0,3 g
DL Acetil Metionina	0,9 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 500 mL.

☑ ÚNICA ASSOCIAÇÃO DE GLICOSE 50% COM VITAMINA B12

Glicoton® B12 é um suplemento energético e vitamínico inovador de ação imediata, à base de Glicose e Vitamina B12, indicado para uso em bovinos, equinos, ovinos e caprinos. Além de fornecer o substrato energético necessário ao animal, seu diferencial é agir como catalizador energético a partir da Vitamina B12.

Modo de uso e dosagem: aplicação intravenosa, 1 vez ao dia, por até 4 dias, a critério do Médico Veterinário. Acrescentar o conteúdo do frasco de Vitamina B12 no frasco da Glicose e agitar antes da aplicação.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Glicose Anidra (Dextrose)	50%
Cianocobalamina (Vitamina B12)	0,4%

Apresentação: 500 e 1000 mL.



ZERO
CARÊNCIA



ZERO
CARÊNCIA

Fortificantes

✓ TRADICIONAL REPOSITOR MINERAL E ENERGÉTICO

Calfomag é um repositore mineral com alta concentração energética e excelente custo benefício, ideal como fortificante para animais debilitados e na resolução da hipocalcemia pós-parto. Indicado para bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos.

Modo de uso e dosagem: aplicação subcutânea, endovenosa lenta ou intraperitoneal, na dose única de 1 mL para cada kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Borogluconato de Cálcio.....	20 g
Glicerofosfato de Sódio	8,99 g
Cloreto de Magnésio	1,87 g*
Cafeína	0,8 g**
Dextrose	20 g
Veículo q.s.p.	100 mL

* Equivalente a 13,40 g de Glicerofosfato de Sódio Hexa-hidratado.

** Equivalente a 4,00 g de Cloreto de Magnésio Hexa-hidratado.

Apresentação: 200 e 500 mL.

✓ REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO E ENERGÉTICO

Hidralac é uma solução hidroeletrólítica concentrada, que contém todos os eletrólitos e a Glicose necessária para reestabelecer a saúde do bezerro desidratado. Hidralac possui alta palatabilidade, é prático e econômico, rendendo 10 doses por frasco.

Modo de uso e dosagem: diluir 50 mL do produto em 2 litros de leite, água ou sucedâneo e administrar por via oral, 2 vezes ao dia, durante dois ou mais dias a depender da necessidade e a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Sódio	70,08 g
Potássio	27,44 g
Cloro	52,4 g
Dextrose	235 g
Valor de energia	940 Kcal

Composição: Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Acetato de Sódio, Dextrose e Água.

Apresentação: 50 e 500 mL.

✓ VITAMINA B12 CONCENTRADA

Turbovit B12 tem como principal indicação o auxílio no tratamento da anemia, por promover incremento da produção de glóbulos vermelhos do sangue, além de aumentar o metabolismo energético e estimular o apetite do animal, proporcionando retorno mais rápido às atividades produtivas.

Modo de uso e dosagem: administração intramuscular ou intravenosa, uma vez por dia por até 2 semanas, na dose de 5 mL para bovinos e equinos adultos e de 2 a 3 mL para animais jovens, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Cianocobalamina (Vitamina B12)	400.000 µg
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 20 mL.



Fortificantes



ZERO
CARÊNCIA

✔ ALTO DESEMPENHO ENERGÉTICO

Catofós® B12 é um fortificante à base de Fósforo Orgânico (100% Butafosfan) e Vitamina B12, que atua como estimulante do metabolismo energético e promove incremento dos índices produtivos e reprodutivos do rebanho.


Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular, intravenosa ou subcutânea, uma vez ao dia, por até duas semanas na dose de 5 a 25 mL, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Butafosfan	10 g
Cianocobalamina (Vitamina B12)	0,005 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 20, 100 e 250 mL.



**Máxima +
Produtividade**

✔ 100% Butafosfan (Fósforo Orgânico) ✔ Ação imediata e alta eficácia



☑ SEM DOR, SEM INFLAMAÇÃO, SEM GASTRITE

Prador® é uma associação sinérgica inovadora de Meloxicam e Dipirona, dois princípios ativos da família dos anti-inflamatórios não esteroidais, sendo um potente inibidor de mediadores da inflamação, com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas, com destaque à excelente ação analgésica. Outro grande diferencial do Prador é a sua seletividade pelas enzimas COX-2 e COX-3, conferindo alta segurança quanto a distúrbios renais e gastrintestinais.

Modo de uso e dosagem: aplicação via intramuscular ou intravenosa, na dose de 1 mL para cada 25 kg de peso vivo, com intervalos de 12 a 24 horas, por 3 a 5 dias consecutivos, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Meloxicam	1 g
Dipirona Sódica	50 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 50 e 100 mL.



☑ ANTI-INFLAMATÓRIO DE ALTA PERFORMANCE

Flumax® possui alta performance anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Além de promover excelente analgesia visceral, o Flunixin Meglumine atua como agente antiendotóxico.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular ou intravenosa, na dosagem de 1 mL para cada 45 kg (equinos), a cada 24 horas, por pelo menos 3 dias, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Flunixin Meglumine	8,3 g *
Veículo q.s.p.	100 mL

*Equivalente a 5,0 g de Flunixin.

Apresentação: 20, 50 e 100 mL.



☑ POTENTE AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA, ANALGÉSICA E ANTITÉRMICA

Diclofenaco J.A é um anti-inflamatório não hormonal indicado para os casos de inflamação, dor e febre em bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular, intravenosa ou subcutânea, na dosagem de 1 mL para cada 50 kg, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias, a critério do Médico Veterinário. Não ultrapassar a dosagem indicada para evitar a ocorrência de distúrbios gastrointestinais.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Diclofenaco de Sódio	5 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 50 e 100 mL.



MAIS LEITE, MAIS LUCRO

Lactocina[®] proporciona a indução da descida do leite e atua também como coadjuvante no tratamento da mastite e das doenças do parto.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular, intravenosa ou subcutânea, de 1 a 5 mL por animal, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Ocitocina sintética	1.000 UI
Veículo q.s.p.....	100 mL

Apresentação: 50 e 100 mL.



24
HORAS
CARÊNCIA
NO LEITE

ANTIMICROBIANO INTRA-UTERINO COM AÇÃO MUCOLÍTICA E LUTEOLÍTICA

Metrifim[®] é uma infusão uterina à base de Oxitetraciclina a 5,7%, o antimicrobiano de eleição para o tratamento da endometrite crônica, enfermidade responsável por prejuízos à reprodução em decorrência à diminuição das taxas de serviço e, conseqüentemente, ao aumento do intervalo entre partos (IEP).

Modo de uso e dosagem: administrar exclusivamente via intrauterina, um frasco de 100 mL para cada animal, usando pipeta e seringa, em intervalos de 24 horas, por 3 dias consecutivos, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Cloridrato de Oxitetraciclina	5,7 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: display com 3 unidades de 100 mL.



ALTA EFICÁCIA LUTEOLÍTICA

Cioton[®] é um produto à base de Prostaglandina Sintética, promovendo luteólise e, conseqüentemente, o retorno à ciclicidade.

Modo de uso e dosagem: aplicação intramuscular na dose de 2 mL em bovinos, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Cloprostenol Sódico	26,3 mg
Veículo q.s.p.	100 mL

Apresentação: 20 e 50 mL.

LANÇAMENTO



☑ SEDATIVO, MIORRELAXANTE E ANALGÉSICO

Dettovet® é à base de Detomidina, fármaco pertencente ao grupo dos agonistas alfa 2 adrenérgicos, que atua de forma central nos receptores alfa 2 adrenérgicos, promovendo tríplex efeito: ação sedativa, analgésica e miorelaxante.

Modo de uso e dosagem: aplicação via intravenosa, na dose de 0,2 a 0,6 ml para cada 100 kg de peso vivo, a depender da intensidade e duração do efeito desejado, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:
 Cloridrato de Detomidina 1 g
 Veículo q.s.p 100 mL

Apresentação: 5 mL.



☑ SEDAÇÃO IMEDIATA À BASE DE XILAZINA

Equisedan é indicado na sedação e tranquilização de equinos, além de ser um dos componentes da anestesia total intravenosa.

Modo de uso e dosagem: aplicação intravenosa, na dosagem de 0,5 a 1,5 mL para cada 100 kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:
 Cloridrato de Xilazina 10 g
 Veículo q.s.p 100 mL

Apresentação: 20 e 50 mL.



☑ ANESTESIA LOCAL POTENCIALIZADA

BLOC é a única associação de Lidocaína e Xilazina do mercado, sem vasoconstritor para bovinos com excelente resultado no uso em bloqueios locais e epidurais.

Modo de uso e dosagem: recomenda-se o uso de 1 mL para cada 100 kg de peso vivo para bloqueios peridurais. **BLOC** também pode ser utilizado em infiltrações locais, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:
 Cloridrato de Lidocaína 2 g
 Cloridrato de Xilazina 0,04 g
 Veículo q.s.p 100 mL

Apresentação: 50 e 100 mL.



☑ ÚNICO EM APRESENTAÇÃO PRONTA PARA USO (PPU)

EGG-PPU é um relaxante muscular de ação central à base de Éter Gliceril Guaiacol, em apresentação pronta para uso (PPU), proporcionando praticidade e segurança em procedimentos anestésicos a campo.

Modo de uso e dosagem: aplicação intravenosa na dosagem de 1 mL para cada kg, a critério do Médico Veterinário.

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:
 Éter Gliceril Guaiacol 10 g
 Veículo q.s.p 100 mL

Apresentação: 500 mL.

PROTÓCOLOS SUGESTIVOS DE TRATAMENTO

DOENÇAS DO PÓS-PARTO	Hipocalcemia	TurboCálcio 1 mL/kg (via IV lenta).	ou	Calfo mag 1 mL/kg (via IV lenta).
	Cetose	Glicoton B12 1 a 2 mL/kg, 1 vez ao dia, por 3 dias (via IV).	+	Dexametasona (a critério do Med. Vet.) 0,04 mg/kg, 1 vez ao dia, por até 3 dias (via IM).
	Retenção de placenta	Lactocina 3 mL/animal entre 12 e 24 horas após o parto (via IM).	+	Diclo tril 3 aplicações (via IM) uma vez ao dia nas seguintes doses: 1º dia: 20 mL* 2º e 3º dia: 15 mL*
	Prevenção das doenças do pós-parto	Cioton (Após 48 horas do parto) 2 mL em dose única (via IM).	+	TurboCálcio 1 mL/kg em dose única, (IV lenta).
	Endometrite Crônica	TurboCálcio 1 mL/kg em dose única (via IV lenta).	+	Catofós B12 20 mL em dose única (via IV ou IM).
MASTITES TERAPIA VACAS EM LACTAÇÃO	Grau 1 - Alteração no leite	Metrifim 1 frasco de 100 mL, 1 vez ao dia, de 1 a 3 dias, a depender do grau de endometrite, após a regressão uterina (20 a 30 dias após o parto, via infusão uterina).		
	Grau 2 - Alteração no leite e no úbere	Mastite Clínica VL 1 seringa por teto, após a ordenha, durante 3 dias (via intramamária).	ou	Mastclin 1 seringa por teto doente, após a ordenha, durante 3 dias (via intramamária).
	Grau 3 - Alteração no leite, no úbere e na vaca	Diclo tril (1ª opção) 3 aplicações (via IM), uma vez ao dia, nas seguintes doses: 1º dia: 20 mL* 2º e 3º dia: 15 mL*	ou	Prador Aplicar de 1 a 2 vezes ao dia, na dose de 1 mL/25 kg, durante 3 a 5 dias (via IM ou IV)
		Gentopen 1 frasco de 12 em 12 horas (via IV ou IM), durante o período de 3 dias no mínimo.*	+	Diclo pen (2ª opção) 1 frasco, uma vez ao dia, de 5 a 7 dias (via IM).
SECAGEM	Terapia de secagem	Flumax 20 mL por dia durante 3 dias (via IM).	+	HIDRATRAÇÃO (soro)
		Intrasec VS 1 seringa por teto, após a última ordenha na secagem.	+	Benzafort 1 mL/10 kg, em dose única (via IM).
CONTROLE PARASITÁRIO	Endoparasitas	Selateto 1 seringa por teto, após a aplicação do intramamário vaca seca, sem massagear.	+	Diclo tril 3 aplicações (via IM), uma vez ao dia, nas seguintes doses: 1º dia: 20 mL* 2º e 3º dia: 15 mL*
	Verminoses e Ectoparasitas	Longamectina Premium 3,5% 1 mL/50 kg (via subcutânea).	ou	Diclo tril 3 aplicações (via IM), uma vez ao dia, nas seguintes doses: 1º dia: 20 mL* 2º e 3º dia: 15 mL*
	Verminose em Equinos	Insemax Pour-on 10 mL/100 kg (via pour-on).	ou	Frigobo i Facilito 1 mL/10 kg (via pour-on).
	Miíases (bicheiras) e feridas	Equijet Administrar 5 g/100 kg (via oral).	ou	Ivermectina 1% JA 1 mL/50 kg (via subcutânea).
DIARRIAS BACTERIANAS PARASITÁRIA	Colibacilose (Curso Branco dos Bezerros)	Tanicura Polvilhar sobre a ferida, no sentido contrário dos pelos.		
	Salmonelose (Paratifo dos Bezerros)	Diclo tril 1 mL/40 kg, uma vez ao dia, durante 3 a 5 dias (via IM ou IV).	+	Hidralac Diluir 50 mL do produto em 2 L de leite, água ou sucedâneo. Administrar 2 vezes ao dia por 2 ou mais dias a critério do Médico Veterinário (via oral).
	Eimeriose (Curso Negro)	Vetflor 1 mL/15 kg, uma vez ao dia, durante 3 dias (via IM).	+	Hidralac Diluir 50 mL do produto em 2 L de leite, água ou sucedâneo. Administrar 2 vezes ao dia por 2 ou mais dias a critério do Médico Veterinário (via oral).
		Vetsulfa 2 mL/15 kg, uma vez ao dia, durante 3 a 5 dias (via IM ou IV).	+	Hidralac Diluir 50 mL do produto em 2 L de leite, água ou sucedâneo. Administrar 2 vezes ao dia por 2 ou mais dias a critério do Médico Veterinário (via oral).

IV. = Intravenosa, IM. = Intramuscular, SC. = Subcutânea. * Dosagem indicada para um animal de grande porte (500 kg), podendo ser alterada a critério do Médico Veterinário. Estes são apenas protocolos sugestivos de tratamento, sendo necessário que se consulte um Médico Veterinário.

Super Aguda**Gentopen**
1 frasco, de 12 em 12 horas, durante o período de 3 dias no mínimo (via IV ou IM).***Flumax**
+ Aplicar 1 vez ao dia, durante 3 dias. EQUINOS: 1 mL/45 kg
BOVINOS: 2 mL/45 kg (via IM ou IV).**Aguda****Diclotril**
3 aplicações (via IM), uma vez ao dia, nas seguintes doses:
1º dia: 20 mL*
2º e 3º dia: 15 mL***Diclopen**
ou 1 frasco, uma vez ao dia, de 5 a 7 dias (via IM).**Sub-aguda****Vetflor**
1 mL/15 kg, de 48 em 48 horas, totalizando 3 aplicações (via IM).**Vetipen**
ou 1 mL/10 kg, de 48 em 48 horas, totalizando 3 aplicações (via IM).**Prevenção (Metaflaxia)****Benzafort**
1 mL/10 kg em dose única (via IM).**Doenças do Umbigo (Onfalite ou Onfaloflebite)****Pró-Bezerro**
Aplicar 1 seringa de 5 mL+ (via IM).
*Dose para bezerro

+

Solução de iodo a 10%
(Uso local)

+

Tanicura
Polvilhar sobre o umbigo para evitar e combater as miíases.**Tristeza Parasitária Bovina (Tristetizinha)****Ganavet Plus**
1 mL/20 kg, em dose única (via IM).

+

Diclotril
1 mL/20 kg, 1 vez ao dia, durante 3 dias (via IM ou IV).

+

Turbobit B12
5 mL/animal*, 1 vez ao dia, por até 2 semanas, a critério do Médico Veterinário (via IM ou IV).**Pododermatite (Doença do casco)****Vetflor** (Casos agudos)
1 mL/15 kg, de 48 em 48 horas, totalizando 3 aplicações (via IM).

ou

Benzafort (Casos brandos)
1 mL/10 kg em dose única (via IM).**Dificuldade para descer o leite****Lactocina**
1 a 2 mL/animal a cada ordenha, durante a lactação via (via IM ou IV).**Intoxicações****Glicoton B12**
1 mL/kg, uma vez ao dia, durante 3 a 5 dias via IV.

+

Turbocálcio
1 mL/kg (via IV lenta).**Inflamações****Prador**
Aplicar de 1 a 2 vezes ao dia, na dose de 1 mL/25 kg, durante 3 a 5 dias (via IM ou IV).

ou

Diclofenaco J.A
1 mL/50 kg, 1 vez ao dia, durante 3 dias (via IM ou IV).

ou

Flumax
Aplicar 1 vez ao dia, durante 3 dias. EQUINOS: 1 mL/45 kg (via IM ou IV). BOVINOS: 2 mL/45 kg (via IM ou IV).**Doenças infecciosas super agudas****Gentopen**
Aplicar 1 frasco de 12 em 12 horas, durante 3 a 6 dias (via IM ou IV).*

+

Flumax
Aplicar 1 vez ao dia, durante 3 dias. EQUINOS: 1 mL/45 kg (via IM ou IV). BOVINOS: 2 mL/45 kg (via IM ou IV).**Adenite Equina (Garrotilho)****Diclopen** (casos agudos)
1 frasco, 1 vez ao dia, de 5 a 7 dias (via IM)

ou

Gentopen (casos super agudos)
1 frasco de 12 em 12 horas, durante 3 dias no mínimo (via IM ou IV).

ou

Benzafort (casos crônicos)
1 mL/10 kg em dose única (via IM).**Leptospirose****Vetipen** (1ª opção)
1 mL/10 kg, de 48 em 48 horas totalizando 3 aplicações (via IM).

+

Prador (2ª opção)
1 mL/25 kg, de 1 a 2 vezes ao dia, durante 3 a 5 dias, a critério do Médico Veterinário (via IM ou IV).**Animais Debilitados e Convalescentes****Catofós B12**
Aplicar 20 mL, 1 vez ao dia, durante 3 dias (via IM, IV, ou SC).

+

Ative A.D.E
5 mL, a cada 30 ou 60 dias (via IM).**Confinamento****Catofós B12**
10 a 20 mL, em dose única na entrada do confinamento.**Inseminação Artificial****Catofós B12**
Aplicar 10 a 20 mL, em dose única na inseminação artificial (via IM, IV, ou SC).**Equinos Atletas****Catofós B12**
20 mL/animal, 1 vez ao dia, durante 5 dias consecutivos. Posteriormente repetir a dose, 1 vez por semana, por até 5 semanas consecutivas via (via IM, IV, ou SC).*

+

Ative A.D.E
5 mL, a cada 30 ou 60 dias (via IM).**Período de Transição****Catofós B12**
20 mL por animal, 15 e 7 dias antes do parto, seguido de mais 20 mL no dia do parto (via IM, IV, ou SC).**Recria****Catofós B12**
Corte: 10 mL por animal no desmame em dose única (via IM, IV, ou SC). Leite: 5 mL no desmame e 5 mL após 15 dias (via SC).

+

Ative A.D.E
5 mL, a cada 30 ou 60 dias (via IM).**Torneio Leiteiro****Catofós B12**
20 mL*/animal, de 5 em 5 dias, durante os 30 dias anteriores ao torneio (via IM, IV, ou SC).

+

TurboCálcio
1 frasco* de 3 em 3 dias durante os 30 dias anteriores ao torneio (via IV lenta).

+

Prador
1 mL/25 kg, 1 vez ao dia (via IM ou IV).**Nascimento de leitões (Prevenção de anemia ferropriva)****Dextran**
1 mL em dose única (via IM).

+

Catofós B12
1 mL em dose única (via IM).**Sedação em equinos****Dettovet**
De 0,2 mL a 0,6 mL/100 kg, a depender da intensidade e duração do efeito desejado a critério do Médico Veterinário (via IV).

ou

Equisedan
1 a 1,5 mL/100 kg (via IV).**Relaxante muscular de ação central****EGG PPU**
Aplicar sob pressão na veia, na dose de 1 mL/kg, 15 minutos após a medicação pré-anestésica (via IV).**Anestesia Local****Bloc**
Fazer infiltração local, a critério do Médico Veterinário.**Anestesia Epidural****Bloc**
1 mL/100 kg em bovinos, a critério do Médico Veterinário (via epidural).

Inovação e compromisso com a pecuária.



 /jasaudeanimal  @jasaudeanimal  /jasaudeanimal

 www.jasaudeanimal.com.br

 Tel 16 3145-9920 / 0800 774 4334